
Diagnostischer Leitfaden zur Bestimmung des Infektionsstatus bei FeLV



*Provirale DNA-Last (Kopien/ml) und Infektionsstatus gemäß Beall et al.[1, 2]

Literatur

1. Wardrop KJ, Birkenheuer A, Blais MC, et al. Update on canine and feline blood donor screening for blood-borne pathogens. J Vet Intern Med. 2016;30(1):15–35. doi:10.1111/jvim.13823
2. Beall MJ, Buch J, Cahill RJ, et al. Evaluation of a quantitative enzyme-linked immunosorbent assay for feline leukemia virus p27 antigen and comparison to proviral DNA loads by real-time polymerase chain reaction. *Comp Immunol Microbiol Infect Dis*. 2019;67:101348. doi:10.1016/j.cimid.2019.101348

© 2025 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • 09-2690670-01 • Die Datenschutzrichtlinie von IDEXX finden Sie unter idexx.com. Alle Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen von IDEXX Laboratories, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

IDEXX GmbH
Humboldtstr. 2
70806 Kornwestheim
idexx.de/snap

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1
1010 Wien
idexx.at/snap

IDEXX Diavet AG
Schlyffistr. 10
8806 Bäch
idexx.ch/snap-de