

Für einen guten Start ins Leben – SNAP® Fohlen IgG


Ein einfacher Test in den ersten Lebensstunden kann entscheidend für die Gesundheit eines neugeborenen Fohlens sein

Die Übertragung von kolostralem IgG ist entscheidend für die Fohlengesundheit. Eine Aufnahme von IgG ist nur in den ersten 18 – 24 Lebensstunden eines Fohlens möglich. Erfolgt keine oder eine nur unzureichende Aufnahme von IgG besteht die Gefahr von schwerwiegenden und möglicherweise tödlichen Infektionen des Fohlens, beispielsweise Polyarthritis, Pneumonie und Enteritis. Wird ein zu niedriger IgG-Spiegel rechtzeitig in den ersten 12 Stunden nach der Geburt festgestellt, ist die Verabreichung von zusätzlichem Kolostrum möglich.

Ein Transfer nach den ersten 18 – 24 Lebensstunden muss intravenös erfolgen. Dies ist nicht nur riskanter für das Fohlen sondern auch erheblich kostenintensiver.

Der SNAP® Fohlen IgG bestimmt den IgG-Spiegel in Vollblut, Plasma oder Serum von Fohlen semiquantitativ. Er kann direkt im Stall durchgeführt werden und liefert in weniger als 10 Minuten Klarheit über den IgG Status eines Fohlens. Mit einem einmaligen Besuch ist so eine Diagnose und gegebenenfalls eine sofortige Behandlung möglich.

Der Test ist in Packungen zu 5 oder 10 Testkits erhältlich.



Durchfallprofile fürs Pferd bei IDEXX

Durchfallerkrankungen können Pferde rasch schwächen und insbesondere bei Fohlen unter Umständen einen tödlichen Ausgang haben. IDEXX bietet zwei Durchfallprofile speziell für Fohlen an

- Durchfallprofil Fohlen 1: bis zum Alter von 60 Tagen
- Durchfallprofil Fohlen 2: ältere Fohlen von 2 – 6 Monaten

Weitere Informationen finden Sie in unserem Leistungsverzeichnis Pferd.

IDEXX GmbH
Mörkestr. 28/3
71636 Ludwigsburg
Tel. 069 153 253 290
info-germany@idexx.com

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1
1010 Wien
Tel. 01 206 092 729
info-austria@idexx.com

IDEXX
LABORATORIES